



DANMARKS KANINAVLERFORENING



SYGDOMME

Meget kan forebygges

Du kan forebygge mange sygdomme hos kaniner gennem god pasning sammen med et godt alsidigt foder. Bliver kaninen alligevel syg, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt, da kaniner er meget skrøbelige over for sygdom.

Diarré eller tynd mave

Diarré eller tynd mave kan blandt andet forekomme ved foderskift eller andre stresspåvirkninger. Virker kaninen apatisk, skal du til dyrlæge med det samme. Kaniner er naturligt spiseglade dyr, så holder de sig fra foderet, sidder blot i et hjørne eller har tynd eller forstoppet mave, skal du til dyrlæge med det samme.

Coccidiose

Coccidier er en lille parasit, der findes i al kaningødning. Men når der kommer for mange, bliver kaninen syg. Sygdommen udvikler sig bedst i varme og fugt, og den medfører voldsom diarré hos unger og ungdyr. Gamle kaniner bliver sjældent syge, da deres modstandskraft er større. Specielt hvis mange dyr går sammen, kan sygdommen blive et stort problem. Kan forebygges gennem god hygiejne, god plads og kontrolleret fodring med kraftfoder, samt store mængder godt hø, men man kan stadig være uheldig eller få smitten med hjem fra en udstilling.

Mange unger dør desværre af sygdommen, og det kræver hurtig og kompetent dyrlægehjælp, hvis kaninerne skal reddes.

Blød og fedtet afføring

En blød og fedtet afføring forekommer ofte hos kaniner, der fodres med dårligt eller meget fedtholdigt foder. Nogle foderblandinger indeholder majs, solsikker og johannesbrød, hvilket er for fed en kost for kaniner. Bedste kur er at fodre med store mængder godt hø, sæsonens grønt, tørt halm og almindelige kaninpiller.

Snue og forkølelse

Kaninen nyser og nyser, der er måske tydelig enten vandigt eller gult snot i næseborene. Af og til breder det sig til lungebetændelse. Da kaninen bruger sine forpoter til at tørre næsen i, ses ret hurtigt tydelige spor af snot på indersiden af forbenene.

Sygdommen er meget smitsom, og derfor bør man straks forsøge at isolere de ramte dyr, hvis man har flere kaniner. De smittede kaniner skal til dyrlæge omgående, da sygdommen ellers er dødelig.

Hvis du strør med halm eller fodrer med hø, der støver, så kan alle kaniner kortvarigt komme til at nyse, uden at de derfor er syge. Ligeledes kan visse typer af spånestrøelse støve, og dette er ikke egnet til kaninbrug.

Øjenbetændelse

Af og til kan et øje pludselig løbe i vand. Det kan være på grund af træk, og i så fald vil øjet blot være vådt. Sæt kaninen i læ, og går det ikke væk, bør du søge dyrlæge. Løbeøjne kan også være tegn på tandrodsproblemer. Er øjet klistret, rødt eller med gulligt puds, skal du til dyrlæge for at få tjekket hornhinde og evt. få salve mod betændelsen.

Vildtvoksende tænder

Kaninens tænder vokser hele livet og slibes mod hinanden. Tandfejl er oftest arveligt, men kan også opstå ved fald eller ved forkert fodring.

En kanin med vildtvoksende tænder er ude af stand til at æde foder, som den skal bide af. Og når det bliver helt galt, så er den ude af stand til at æde noget som helst.

Tandfejl kan være meget smertefuldt for kaniner. Kæledyr bør få slebet tænderne ned i narkose (tænderne må aldrig klippes, da de kan splintre ned i nerverne). Disse dyr må aldrig avles på.




Fine tænder!

Bidsår, rifter og skrammer

Har din kanin bidsår, og bor den ikke alene, bør flokken skilles permanent.

Rifter og skrammer kan opstå ved uheld. Er de små, behandles de med Klorhexidin-pudder, der fås i håndkøb på apoteket. Større rifter og skrammer skal du selvfølgelig lade en dyrlæge behandle, så kaninen også kan smertedækkes.



Så slemt kan det se ud!

Klip kløerne

Ligesom du klipper dine egne negle, skal du klippe kløerne på kaninen med jævne mellemrum. Nogen kaniner slider dem så meget selv, at det kun er

nødvendig hvert halve år. Hos andre skal du gøre det hver tredje måned. Klipper du dem ikke, bliver det smertefuldt for kaninen at gå på dem. Det er let at klippe lyse kløer, hvor du kan se blodåren inde i kloen. Det er lidt sværere med mørke kløer. Klip et par millimeter fra blodåren. Få eventuelt en erfaren avler eller dyrlægen til at vise dig hvordan. Med lidt rutine kan du kan nemt gøre det selv. Neglesaksen køber du i dyrehandleren. Begynder det at bløde, fordi du er kommet til at klippe for tæt på blodåren ved et uheld, eller brækker kaninen en negl ved et uheld, så er det ikke noget farligt. Hold eventuelt en ren, våd, kold klud på til blødningen standser, og sørg for, at kaninen holder sig i ro de næste par timer.

Mider

Mider kan komme i pels, i huden og i ørerne. Det ser ofte ud som skæl i pelsen. Behandling i samarbejde med dyrlæge, og husk, at mider kan være smitsomme, og at også udstyr som seler, børster osv bør decinficeres eller lægges i fryseren. Rådfør dig altid med dyrlæge inden behandling, da kaniner for eksempel ikke kan tåle parasitmidlet Frontline.

Myxomatose og VHD

Både myxomatose og VHD er sjældne, men alvorlige og dødelige sygdomme. Myxomatose optræder ofte som epidemi i sensommeren og efterårs-månederne. VHD ses hele året. Det er muligt at vaccinere mod både myxomatose, VHD og VHD2, der alle ses i Danmark med jævne mellemrum. Kontakt din lokalforening og hør, hvilke dyrlæger, der vaccinerer i området.

Mere om sygdomme

Når Danmarks Kaninavlerforening får kendskab til udbrud af kaninsygdomme, melder foreningen ud på www.kaniner.dk, og på facebook siden 'Danmarks Kaninavlerforening, hvordan man bør forholde sig med hensyn til udstillinger og andre arrangementer med kaniner.

Oplever du mange akutte dødsfald i dit kaninhold, så ring til din nærmeste lokalforening, så de kan rådgive dig og sørge for, at smitten ikke breder sig.

Kontakt

Danmarks Kaninavlerforening
E-mail: hovedkontor@kaniner.dk
Hjemmeside: www.kaniner.dk

Lokalforening

Bornholms Racekanin Forening
ved Bastian Bech Tlf. 24 26 38 78
www.bornholmsracekaninforening.dk
Foreningen er også på facebook