

# Forskellige grunde til dårlige rugeresultater hovedsagligt for fasaner og foreslået afhjælpning.

Symptomer	• Sandsynlig årsag	• afhjælpning
Klart æg. Ingen blodring eller ansats til foster.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dårlige avlshaner.</li> <li>• Æggende er for gamle.</li> <li>• Avlshønsene fejler nærede.</li> <li>• Avlshønsene går for tæt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haner med god livskraft.</li> <li>• Æggene højst 10 dage gamle.</li> <li>• Kontroller foder/foderstand.</li> <li>• Nedsæt antallet af høns i voliere.</li> </ul>
Klart æg ved lysning, men viser blod eller meget lille foster i udvikling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For høj rumtemperatur.</li> <li>• For kold rumtemperatur</li> <li>• Avlsfuglene ude af Kondition, syge fugle, ect.</li> <li>• Vitaminmangel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguler rumtemperaturen ned.</li> <li>• Reguler rumtemperaturen op.</li> <li>• Kassér æg fra fugle med sygdom, ect.</li> <li>• Reguler vitamintilførslen vha. grønmel, ect.</li> </ul>
Dødt foster 3 dagen 7-10 dagen 12-18 dagen 14-19 dagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangelfuld ventilation i rugemaskine.</li> <li>• Forkert rugetemperatur.</li> <li>• Forkert fodring.</li> <li>• vitamin-mangel.</li> <li>• D-vitamin mangel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nøjagtig temperaturregulering 100°F.</li> <li>• God ventilation i rugemaskinen og frisk lufttilførsel (ilt) i rugerummet.</li> <li>• Giv majs, majs, mælk, lucernegrønmel eller tør D-vitamin.</li> </ul>
Velskabt kylling, men død <u>uden</u> at bryde skallen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forkert vending af ægget.</li> <li>• For lille vending af ægget.</li> <li>• Arveligt.</li> <li>• Forkert temperatur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vend æggene mindst 5 max 24 gange i døgnet.</li> <li>• Kontroller at bakken vender 45°(mervending)</li> <li>• Vær omhyggelig ved valg af avlsfugle.</li> <li>• Reguler temperaturen i rugemaskinen.</li> </ul>
Ægget brudt men kyllingen død i skallen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lav gns. Fugtighed.</li> <li>• Lav gns. Temperatur.</li> <li>• Pludselige temperaturchok/hop.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øg fugtigheden i maskinen. Gns.42%.</li> <li>• Hold den rigtige temperatur gennem hele rugeforløbet kontroller dagligt.</li> <li>• Pas på temperaturchok/hop.</li> </ul>
Fastsiddende kyllinger. skallen klæber til kyllingen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Æggene er tørret for meget.</li> <li>• For lav fugtighed under klækningen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hold fugtigheden så høj som mulig i klækkeren.</li> <li>• Undgå for mange åbninger af låger under klækningen.</li> </ul>
Klæbede kyllinger. Kyllinger indsmurt i ægindhold.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lav gns.temperatur.</li> <li>• Lille luftblærer pga. for høj fugtighed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguler temperaturen.</li> <li>• Kontroller temperaturen</li> <li>• Højere ventilation og lavere fugtighed.</li> </ul>
Navlekylinger. Kyllinger som ikke på naturlig måde har opslugt æggeblommen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For høj temperatur eller store temperatursvingninger.</li> <li>• For lav gns. Fugtighed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meget omhyggelig temperaturregulering.</li> <li>• Kontroller temperaturen</li> <li>• Rigtig fugtighed.</li> </ul>
For små kyllinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Små æg</li> <li>• Lav fugtighed</li> <li>• Høj temperatur</li> <li>• vitaminmangel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rug kun på std.vægt æg.</li> <li>• Hold fugtigheden stabil og korrekt.</li> <li>• Reguler temperaturen.</li> <li>• Kontroller temperaturen</li> <li>• Giv hønerne vitamintilførsel.</li> </ul>
Store bløddlemmede kyllinger.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lav gns.temperatur.</li> <li>• Dårlig ventilation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguler temperaturen.</li> <li>• Kontroller temperaturen</li> <li>• Reguler ventilationen efter manual.</li> </ul>
Døde ildelugtende kyllinger i klækkeskufferne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navlen inficeret i forrugereren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for omhyggelig desinfektion af rugemaskinen mellem klækningerne.</li> </ul>
Kyllingerne kommer for tidligt eller over lang tid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For høj rugetemperatur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguler temperaturen.</li> <li>• Kontroller temperaturen</li> </ul>
Forlænget klækning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For høj temperatur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguler temperaturen.</li> <li>• Kontroller temperaturen</li> </ul>
Forsinket klækning. Først på 21.dagen eller senere.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For lav gns. Temperatur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguler temperaturen.</li> <li>• Kontroller temperaturen.</li> </ul>
Krumme tær.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forkert temperatur.</li> <li>• Vitaminmangel i hønsefoderet.</li> <li>• Klækkede kyllinger har været for længe i forrugereren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguler temperaturen.</li> <li>• Kontroller temperaturen</li> <li>• Giv vitamintilskud til hønsene.</li> <li>• Kontroller og fjern op til klækningen, jævnlige kyllinger i forrugereren.</li> </ul>
Forkert fosterstilling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Æggets stilling under rugningen</li> <li>• Æglægningstidspunktet.!!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ægget anbragt rigtigt i bakken og vendt 5-24 gange pr.døgn.</li> </ul>